

Ιγμορίτιδες

Η ιγμορίτιδα είναι μία πολύ συχνή πάθηση, ειδικά στη διάρκεια του χειμώνα. Πρόκειται για φλεγμονή των ιγμορείων άντρων (πρόκειται για δύο κοιλότητες που βρίσκονται εκατέρωθεν της μύτης κάτω από τα μάτια και πάνω από το στόμα), οι οποίες αντί να περιέχουν αέρα, περιέχουν υγρό(πύο) ή πολυποειδή στοιχεία.

Νεότερες κατατάξεις αναφέρονται στις παθήσεις αυτές ως ρινο-ιγμορίτιδες καθώς συνυπολογίζουν ότι οι φλεγμονές των ιγμορείων δεν μπορούν να συμβούν χωρίς άλλες φλεγμονές της ρινικής κοιλότητας (ρινίτιδες). Οι τελευταίες συχνά οφείλονται σε αερομεταφερόμενους παράγοντες αλλεργίας και είναι κοινές την άνοιξη.

Η οξεία ιγμορίτιδα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα:

- ενός κοινού κρυολογήματος
- φλεγμονών δοντιών της άνω γνάθου
- επιπλεγμένων καταγμάτων του προσώπου
- κατάδυσης σε μολυσμένα ύδατα ή κολύμβησης σε μολυσμένες πισίνες
- κατάδυσης σε μεγάλο βάθος χωρίς απόφραξη της ρινός.

Τα συχνότερα μικρόβια που ενοχοποιούνται για ιγμορίτιδα είναι ο πνευμονιόκοκκος, ο στρεπτόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος, ο αιμόφιλος, η μοραξέλα και σπανιότερα αναερόβια βακτήρια, ενώ στα παιδιά ενοχοποιούνται διάφοροι ιοί.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της ιγμορίτιδας μπορεί να είναι κεφαλαλγία, αίσθημα τάσης προσώπου, ρινική συμφόρηση, πυώδης ρινόρροια, βήχας, κακοδιαθεσία, δεκατική πυρετική κίνηση, οδονταλγία, οπισθορινικές εκκρίσεις, καταβολή, κακοδιαθεσία, κακοσμία στόματος κ.α

Οι πιθανές επιπλοκές μιας παραμελημένης ιγμορίτιδας μπορούν να είναι βλενογοννοκήλη, οστεομυελίτιδα οστών του κρανίου, μηνιγγίτιδα, θρόμβωση του σηραγγώδους κόλπου, εγκεφαλικό απόστημα, επέκταση της φλεγμονής στον οφθαλμικό κόγχχο με συνέπεια διπλωπία ή και τύφλωση κ.α